

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Biomatematyka

Zadanie **1.** (8 punktów)

Zakładamy, że nukleotydy na poszczególnych pozycjach w genomie bakterii *E. coli* o długości 4.7×10^6 par zasad występują w sposób niezależny z tą samą częstością. Jakiej ilości fragmentów restrykcyjnych możemy oczekiwać po przeprowadzeniu kompletnego trawienia enzymem restrykcyjnym *Hae* III, który rozpoznaje fragment GGCC?

Zadanie **2.** (8 punktów)

Przyjmijmy, że mutacje nukleotydów w DNA następują zgodnie z modelem Kimury z parametrem transwersji α i tranzycji β , a więc substytucje nukleotydów opisane są przez łańcuch Markowa o macierzy przejść w jednym kroku postaci

$$\begin{bmatrix} 1 - \alpha - 2\beta & \beta & \beta & \alpha \\ \beta & 1 - \alpha - 2\beta & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha & 1 - \alpha - 2\beta & \beta \\ \alpha & \beta & \beta & 1 - \alpha - 2\beta \end{bmatrix}$$

Jaką frakcję poszczególnych nukleotydów będziemy obserwować, w tak ewoluującym DNA, po upływie długiego czasu?

Zadanie **3.** (8 punktów)

W urnie znajduje się N kul ponumerowanych liczbami od 1 do N . Losujemy bez zwracania próbkę o liczebności n . Oznaczmy przez η największy spośród numerów kul w tej próbce. Znajdź rozkład zmiennej losowej η .

Zadanie 4. (8 punktów)

Przyjmujemy, że wytrzymałość betonu ma rozkład normalny ze średnią wytrzymałością na ściskanie równą $203 \times 10^5 N/m^2$. W celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie pewnej partii betonu, która wedle zapewnień producenta ma większą wytrzymałość na ściskanie niż przeciętna, dokonano $n = 80$ niezależnych pomiarów wytrzymałości tego betonu otrzymując następujące wyniki (w $10^5 N/m^2$):

Wytrzymałość	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214
Liczba pomiarów	6	12	26	20	11	5

- (a) Skonstruuj przedział ufności na poziomie ufności 0,99 dla średniej.
- (b) Przeprowadź test dotyczący średniej wytrzymałości na ściskanie tej partii betonu na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.
- (c) Jak jest twoja konkluzja po przeprowadzeniu testu?

Zadanie 5. (8 punktów)

Znajdź rozwiązanie $y = y(t)$ zagadnienia

$$y'' + y' - 2y = 18te^t$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1.$$

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Zadanie **1.** (8 punktów)

Właściciel obszaru o powierzchni 4 ha (40 000 m²) postanowił założyć na nim sad jabłoni, przeznaczając na ten cel 30 000 zł. Ma do wyboru 3 gatunki sadzonek jabłoni w cenie:

gatunek A – 10 zł/szt., gatunek B – 20 zł/szt., gatunek C – 15 zł/szt.

Gatunki te mają różne wymagania pielęgnacyjne; między innymi

1 drzewo gatunku A zajmuje 16 m² powierzchni, gatunku B – 10 m², a gatunku C – 20 m².

Wiadomo też, że ze względu na wydajność oraz ceny owoców zysk z tytułu eksploatacji drzewa

gatunku A wynosi 2 000 zł, gatunku B – 2 500 zł, a gatunku C – 3 000 zł rocznie.

Ułóż odpowiednie zadanie programowania liniowego i znajdź jego rozwiązanie optymalne.

Zadanie **2.** (8 punktów)

Zakładamy hipotezę jednorodnej populacji oraz $s(x) = P(T > x) = \frac{\sqrt{100-x}}{10}$, dla $0 \leq x \leq 100$.

1) Wyznaczyć prawdopodobieństwo ${}_{36}p_{24}$ tego, że 24-latek przeżyje co najmniej 36 lat.

2) Przy założeniu hipotezy jednostajności (HU) obliczyć prawdopodobieństwo ${}_{0.5}q_{30}$ tego, że 30-latek umrze przed upływem 1/2 roku.

Zadanie **3.** (8 punktów)

Szkoda X ma rozkład równomierny na zbiorze $\{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$. Dla kontraktu stop-loss $I_d(X)$ obliczyć:

1) $E(I_2(X))$.

2) $Var(I_1(X))$.

Zadanie 4. (8 punktów)

Przyjmujemy, że wytrzymałość betonu ma rozkład normalny ze średnią wytrzymałością na ściskanie równą $203 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. W celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie pewnej partii betonu, która wedle zapewnień producenta ma większą wytrzymałość na ściskanie niż przeciętna, dokonano $n = 80$ niezależnych pomiarów wytrzymałości tego betonu otrzymując następujące wyniki (w 10^5 N/m^2):

Wytrzymałość	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214
Liczba pomiarów	6	12	26	20	11	5

- (a) Skonstruuj przedział ufności na poziomie ufności 0,99 dla średniej.
- (b) Przeprowadź test dotyczący średniej wytrzymałości na ściskanie tej partii betonu na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.
- (c) Jak jest twoja konkluzja po przeprowadzeniu testu?

Zadanie 5. (8 punktów)

Znajdź rozwiązanie $y = y(t)$ zagadnienia

$$y'' + y' - 2y = 18te^t$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1.$$

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Matematyka z informatyką

Zadanie **1.** (8 punktów)

W pliku a.cpp jest źródło programu:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    int m,n,M,N;

    M = m = 21;
    N = n = 6;
    for(int k=n%m ; k ; n=m,m=k,k=n%m)
        ;
    printf("\nWynik: %i\n",N*M/m);
    return 0;
}
```

Wykonujemy następujące komendy (gcc version 2.95.4):

```
gcc -Wall a.cpp -o a
./a
```

Opisać, co pojawi się na ekranie komputera.

Zadanie **2.** (8 punktów)

Dla liczby $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$ i jej komputerowej reprezentacji \bar{x} wielkość

$$\varepsilon_x = \frac{\bar{x} - x}{x}$$

nazywamy *błędem względnym* wartości \bar{x} . Wykazać równość:

$$\varepsilon_{x+y} = \frac{x}{x+y} \varepsilon_x + \frac{y}{x+y} \varepsilon_y,$$

gdzie $x \neq 0$, $y \neq 0$ i $x+y \neq 0$.

Zadanie **3.** (8 punktów)

Niech funkcja $f \in C^3[-1,1]$ ma ciągłą trzecią pochodną.

Jak należy wybrać $x_0, x_1, x_2 \in [-1,1]$, aby dla wielomianu interpolacyjnego $p = p(x)$ stopnia co najwyżej dwa, spełniającego $f(x_i) = p(x_i)$, $i = 0, 1, 2$ oraz dla dowolnej liczby $x \in [-1,1]$ zachodziła nierówność

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{2^2 3!} \max_{-1 \leq t \leq 1} |f'''(t)| ?$$

Zadanie 4. (8 punktów)

Przyjmujemy, że wytrzymałość betonu ma rozkład normalny ze średnią wytrzymałością na ściskanie równą $203 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. W celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie pewnej partii betonu, która wedle zapewnień producenta ma większą wytrzymałość na ściskanie niż przeciętna, dokonano $n = 80$ niezależnych pomiarów wytrzymałości tego betonu otrzymując następujące wyniki (w 10^5 N/m^2):

Wytrzymałość	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214
Liczba pomiarów	6	12	26	20	11	5

- (a) Skonstruuj przedział ufności na poziomie ufności 0,99 dla średniej.
- (b) Przeprowadź test dotyczący średniej wytrzymałości na ściskanie tej partii betonu na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.
- (c) Jak jest twoja konkluzja po przeprowadzeniu testu?

Zadanie 5. (8 punktów)

Znajdź rozwiązanie $y = y(t)$ zagadnienia

$$y'' + y' - 2y = 18te^t$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1.$$

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Matematyka nauczycielska

Zadanie **1.** (8 punktów)

Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne p , $p > 1$, dla których prawdziwe jest stwierdzenie:

Liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma jej cyfr w systemie pozycyjnym o podstawie p jest podzielna przez 3.

Zadanie **2.** (8 punktów)

Uzasadnić, że wykres funkcji $y = x^2 - 5x + 6$ jest miejscem geometrycznym punktów równo odległych od pewnego punktu (ogniska) F i prostej (kierownicy) l .

Zadanie **3.** (8 punktów)

Niech dany będzie prostopadłościan, którego krawędzie mają długości a , a i $2a$. Niech $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ będą rzutami prostopadłymi wierzchołków tego prostopadłościanu na jego przekątną. Jakie są odległości punktów $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ od końców rozważanej przekątnej?

Zadanie 4. (8 punktów)

Przyjmujemy, że wytrzymałość betonu ma rozkład normalny ze średnią wytrzymałością na ściskanie równą $203 \times 10^5 N/m^2$. W celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie pewnej partii betonu, która wedle zapewnień producenta ma większą wytrzymałość na ściskanie niż przeciętna, dokonano $n = 80$ niezależnych pomiarów wytrzymałości tego betonu otrzymując następujące wyniki (w $10^5 N/m^2$):

Wytrzymałość	190-194	194-198	198-202	202-206	206-210	210-214
Liczba pomiarów	6	12	26	20	11	5

- (a) Skonstruuj przedział ufności na poziomie ufności 0,99 dla średniej.
- (b) Przeprowadź test dotyczący średniej wytrzymałości na ściskanie tej partii betonu na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.
- (c) Jak jest twoja konkluzja po przeprowadzeniu testu?

Zadanie 5. (8 punktów)

Znajdź rozwiązanie $y = y(t)$ zagadnienia

$$y'' + y' - 2y = 18te^t$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1.$$

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Matematyka teoretyczna

Zadanie **1.** (10 punktów)

Niech $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ będą dodatnio określonymi symetrycznymi macierzami o wyrazach rzeczywistych. Uzasadnić, że wszystkie wartości własne macierzy AB są rzeczywiste i dodatnie.

Zadanie **2.** (10 punktów)

Rozważamy operator L , który funkcji $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ przyporządkowuje funkcję $Lf(x) = x \cdot f(x)$. Niech $L^1 = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty\}$ oraz $L_x^1 = \{f \in L^1; Lf \in L^1\}$.

Uzasadnić, że

A. L_x^1 jest właściwą i gęstą podprzestrzenią w L^1

B. operator $L: L_x^1 \rightarrow L^1$ nie jest ciągły względem normy L^1 .

Zadanie **3.** (10 punktów)

Uzasadnić, że rodzina wszystkich przeliczalnych podzbiorów (skończonych i nieskończonych) zbioru mocy continuum ma moc continuum.

Zadanie **4.** (10 punktów)

Uzasadnić, że całka nieoznaczona z rzeczywistej funkcji ciągłej nieparzystej jest funkcją parzystą.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 21.09.2004
Zastosowania

Zadanie **1.** (8 punktów)

Niech $\{B(t); t \geq 0\}$ będzie standardowym ruchem Browna i niech $T > 0$ będzie stałą. Znaleźć wszystkie $a > 0$ takie, że proces $\{W_a(t); t \geq 0\}$ określony jako

$$W_a(t) = \begin{cases} B(t) & \text{dla } t \leq T \\ aB(T) - B(t) & \text{dla } t > T \end{cases}$$

jest standardowym ruchem Browna.

Zadanie **2.** (8 punktów)

Niech $\{X_n\}, \{Y_n\}$ będą wzajemnie niezależnymi ciągami niezależnych zmiennych losowych o rozkładach odpowiednio

$$P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = 1/2$$

oraz

$$P(Y_n = 2) = P(Y_n = -2) = 1/2.$$

Zbadać zbieżność według rozkładu dla

a)

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n}},$$

gdy $n \rightarrow \infty$.

b)

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n \log(n)}},$$

gdy $n \rightarrow \infty$.

Zadanie **3.** (8 punktów)

Niech (X_1, \dots, X_n) będzie próbą rozmiaru n z rozkładu o gęstości względem miary Lebesgue'a postaci

$$f(x; \theta) = \theta \exp(-\theta x) 1_{(0, \infty)}(x),$$

$\theta > 0$. Znaleźć minimalną statystykę dostateczną dla parametru θ . Odpowiedź uzasadnić cytując odpowiednie twierdzenia.

Zadanie **4.** (8 punktów)

Niech $\{N(t); t \geq 0\}$ będzie procesem Poissona z intensywnością $\lambda > 0$. Wykazać, że dla dowolnego $t \geq 0$ i pewnej funkcji Ψ zachodzi równość

$$E \exp(i\theta N(t)) = \exp(t\Psi(\theta))$$

oraz podać postać funkcji Ψ .

Zadanie **5.** (8 punktów)

Znajdź rozwiązanie $y = y(t)$ zagadnienia

$$y'' + y' - 2y = 18te^t$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1.$$